

## Webadresse der Quelle:

<https://www.alzheimer-bw.de/grundwissen-demenz/formen-von-demenzerkrankungen/weitere-haeufige-demenzformen/>

## Weitere häufige Demenzformen

### Vaskuläre Demenz

Sie wird durch Durchblutungsstörungen des Gehirns verursacht. Verengungen oder Verschlüsse von Blutgefäßen im Gehirn rufen eine Mangelversorgung des Hirngewebes hervor. Auslöser solcher Vorgänge können zum Beispiel ein langjähriger Bluthochdruck oder ein Schlaganfall sein.

Aufgrund ihrer Häufigkeit und einer anderen medizinischen Behandlungsweise ist die Unterscheidung von der Alzheimer Demenz von großer Bedeutung. In der Praxis treten die Alzheimer Demenz und eine vaskuläre Demenz sehr häufig gemeinsam, also in Kombination auf.

### Vaskuläre Demenz

Infos kurz und kompakt

### Lewy-Body-Demenz

Die Lewy-Körperchen-Demenz (engl. "dementia with Lewy-bodies", DLB) ist deutlich seltener als die Alzheimer-Demenz, tritt aber bei rund 5 % aller Demenzerkrankungen auf. Neben einer fortschreitenden Gedächtnisstörung zeigen die Patient\*innen psychotische Symptome und / oder Bewegungsstörungen wie bei der Parkinson-Krankheit sowie auffällige Schwankungen ihrer geistigen Fähigkeiten und ihrer Wachheit im Tagesverlauf.

### Die Lewy-Körperchen-Demenz

Infos kurz und kompakt